***DER EINSTIEG / COMMENT / GETTING STARTED /* INNAN ANVÄNDNING**
(bitte aufmerksam durchlesen!) (à lire attentivement !) (please read carefully!) (läs noggrant!)

D - *Deutsch*

Danke, dass sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Wir werden alles daran setzen, sie damit gut durch die mutterlose Aufzucht zu begleiten.

Die **Anzahl** der Fütterungen bzw. der Mahlzeiten **hängt grundlegend erst einmal vom Alter ab**. Hinzu kommen die Faktoren: Größe und Gewicht.

Während Neugeborene sich quasi **stündlich** bis 2-stündlich am Gesäuge der Mutter einfinden, nimmt es mit zunehmendem Alter ab, bis hin zur kompletten Abnabelung. Für diese komplette Zeit muss ein Welpe, Kitten oder ein anderes Tierbaby, bei mutterloser Aufzucht oder eingeschränkter Verfügbarkeit der Mutter, optimal versorgt sein!

Nachfolgende Fütterungshilfen sind **reine Empfehlung und keine ärztlichen Ratschläge** oder Anweisungen. Es sind unsere langjährigen Erfahrungen, die wir gerne an sie weitergeben.

Viel Erfolg bei der Aufzucht ihres Tierbabys.

F - Français

Merci d'avoir choisi nos produits. Nous ferons tout notre possible pour vous accompagner dans votre démarche de nourrisage, de vos chiots ou de vos chatons dans le besoin ou sans mère. Le nombre de tétées ou de repas **dépend fondamentalement de l'âge.** À cela s'ajoutent les facteurs : taille et poids.

Alors que les nouveau-nés viennent aux tétines de leur mère presque **toutes les heures** à 2 heures, cela diminue avec l'âge, jusqu'au sectionnement complet de l'ombilic. Un chiot, un chaton ou un autre bébé animal doit être soigné de manière optimale pendant toute cette période s'il est élevé sans mère ou si la mère n'est disponible que de manière limitée!

Les aides à l'alimentation suivantes **sont purement des recommandations** et non des conseils ou des instructions médicales. C'est notre longue expérience que nous sommes heureux de vous transmettre.

Bon courage pour élever votre bébé animal.

E - English

Thank you for choosing our products. We will do everything we can to support you to go through raising the puppies and kitten without a mother.

The **number** of feedings or meals **depends fundamentally on age**. Added to this are the factors:
size and weight.

While newborns spend time on their mother's teats **almost every hour** to every two hours, this decreases as they get older, up to the point where the umbilical cord is completely removed. For this entire period, a puppy, kitten or other baby animal must be optimally cared for if it is raised without a mother or the mother's availability is limited!

The following feeding aids are **purely recommendations and not medical advice or instructions.** It is our many years of experience that we are happy to pass on to you.

Good luck raising your baby animal.

S - Svenska

Tack för att du valt våra produkter! Vi gör allt för att stötta dig under uppfödning av katter och valpar.
Antalet måltider beror på **ålder**, samt storlek och vikt.

Nyfödda valpar och kattungar diar hos sin mor **nästa varje timme**, eller varannan timme. Detta minskar allt eftersom ungarna blir äldre, fram till dess att deras navelsträng lossnat helt. Under denna period behöver valpar, kattungar och andra djur optimal omvårdnad om den förlorat sin mor, eller om modern av någon annan anledning inte kan finnas hos sina ungar!

Följande utfodringshjälp består endast av **rekommendationer, inte medicinska råd**. Dessa är resultatet av flera år av våra erfarenheter, som vi delar vidare med dig.

Lycka till med din uppfödning!

VORBEREITUNG

- ✔ **Milch** möglichst **FRISCH** zubereiten. Es ist nicht schädlich, danach nochmal aufzuwärmen, aber denken sie daran, dass die Milch keine Konservierungsstoffe oder Antioxidantien enthält!
  Wenn die Milch nochmal aufgewärmt wird, möglichst im Wasserbad oder im Milchflaschenwärmer. Danach gut umrühren, dass sich alle Inhaltsstoffe wieder gut vermischen.
  *(Empfehlung: im Wasserbad. **Vermeiden sie Mikrowelle,** um die Inhaltsstoffe nicht zu zerstören.)*
- ✔ **Keimfreies Wasser**. In manchen Gebieten ist das Wasser aus dem Wasserhahn nicht sauber genug für ein kleines Tierbaby.
  *(Empfehlung: die ersten 3-4 Wochen „Stilles Wasser“ kaufen oder Hahnenwasser abkochen, **keimfrei = mind. 3 Minuten voll kochend**)*
- ✔ **Wasser in das Pulver rühren.** Da das Pulver sonst nur schwer zu vermischen ist, auf Grund seiner natürlichen Inhaltsstoffe schwimmt es gerne oben auf.
- ✔ **LAKMIL® BEUTEL** stehen sicher auf ihrer Anrichte. So können sie mit ihrem Messlöffel problemlos das Pulver entnehmen. Unsere Verpackungen sind Licht- und Luftdicht wiederverschließbar. Stets kühl und trocken lagern. *(trocken und kühl lagern, unter 25°)*

Anrühr-Temperatur: 50-55°	**Fütter-Temperatur: max. 38°**
gut umrühren mit dem Schneebesen, in der Flasche ordentlich schütteln oder mixen *(den Schaum nachher abnehmen, dass der Welpe nicht Luft ansaugt und sich verschluckt).*	(die Körpertemperatur der Mutter ist ca. 38,5°). → Keinefalls weniger als **35°** Das ist zu kühl für den Welpen/das Kitten. Sie benötigen mind. 34° für ihre Verdauung.

- ➔ Bevor sie ihren Welpen, Kitten oder ein anderes Tierbaby füttern, **wiegen** sie es. Manchmal ist die getrunkene Menge kaum sichtbar und so wissen sie, wieviel Gramm es nach dem Füttern schwerer ist.
- ➔ Für ihre Notizen halten wir bei all unseren Produkten auf unserer Webseite einen **LAKMIL® Futterplan** *zum Download bereit.*

ZUBEREITUNG

Flaschen, Fütterhilfen NOURRINOU BIBI® und Sonden finden sie in unserem Shop www.lakmil.de

- ◆ Bei den Standardflaschen darauf achten, ob sie sich nicht verschlucken.
- ◆ Bei NOURRINOU BIBI® ist fertig und kann direkt eingesetzt werden. (Löcher vorhanden)
- ◆ Bei unseren 3-Stufen Sauger ist das einfach regulierbar, durch das Drehen der Flasche.
- ◆ Bei der kleinen Softbottle muss das Loch selbst gestochen werden. Eine Nadel für die schrittweise Öffnung legen wir bei.

! Achtung: die Löcher dürfen **nicht zu groß sein**, sonst ist der Durchfluss zu stark und das Tierbaby kann sich gefährlich verschlucken. Die Löcher dürfen **nicht zu klein sein,** sonst bekommt das Tierbaby zu wenig ab und ist müde vom Saugen. Hat daher kaum was getrunken und schläft vor Erschöpfung ein.

Um ihren ungefähren Bedarf zu errechnen oder einzuschätzen, können sie hier anhand der Tabelle entnehmen, welche Menge an Milch der **Durchschnitt** bei der Milchaufnahme der Welpen sein kann.

- ✗ Sie füttern **TAG und NACHT**. 5-6 Mahlzeiten reichen daher nicht aus.
- ✗ Welpen & Kitten benötigen in den ersten Tagen **alle Stunde** ihre Nahrung.
- ✗ Danach pendelt es sich auf alle **2 Stunden** ein. TAG und NACHT!
- ✗ Nach dem Füttern = Bäuchlein für die Verdauung reiben. Wichtig!
- ✗ Temperatur in der Wurfkiste konstant halten, keine Zugluft (kann auch zu Durchfällen führen) 28° wäre gut.
- ✗ **Raumtemperatur** nicht unter 26° wäre (Empfehlung)
- ✗ **Umgebungstemperatur** direkt beim Welpen wären 30° empfehlenswert.

WICHTIG: Tiere sind keine Maschinen. Der Futterbedarf kann variieren.

F - Français

LA PRÉPARATION

- ✔ Préparez **le lait** le plus **FRAIS** possible. Il n'y a pas de mal à réchauffer après, mais rappelez-vous que le lait ne contient ni conservateur ni antioxydant !
  Si le lait est réchauffé, faites le si possible dans un bain-marie ou dans un chauffe-biberon. Puis remuez bien pour que tous les ingrédients se mélangent bien à nouveau.
  (Recommandation : au bain-marie. Eviter le micro-ondes pour ne pas détruire les ingrédients.)
- ✔ **Eau exempte de germes.** Dans certaines régions, l'eau du robinet n'est pas assez propre pour un petit bébé animal.
  *(Recommandation: achetez de l'«eau plate» pendant les 3-4 premières semaines ou faites bouillir l'eau du robinet, **sans germe = faire bouillir pendant au moins 3 minutes**)*
- ✔ **Incorporer de l'eau DANS la poudre.** La poudre étant difficile à mélanger, en raison de ses ingrédients naturels, elle pourrait flotter sur le dessus.
- ✔ Les **SACS LAKMIL®** tiennent solidement sur votre table. Ainsi, vous pouvez facilement retirer la poudre avec votre cuillère doseuse. Nos emballages sont légers, hermétiques et refermables. Toujours stocker dans un endroit frais et sec. *(À conserver dans un endroit frais et sec, inférieure à 25 °C).*

Température de mélange: 50-55° Bien remuer avec un fouet, secouer ou bien mélanger dans le biberon *(enlever ensuite la mousse pour que le chiot n'aspire pas d'air et s'étouffe).*	**Température d'alimentation: 38° maximum** *(la température corporelle de la mère est d'environ 38,5°).* → Jamais moins **de 35°** C'est trop froid pour le chiot/chaton. Ils ont besoin d'au moins 34° pour leur digestion.

- ➔ Avant de nourrir votre chiot, chaton ou autre bébé animal, **pesez** le avant et après le nourrissage. Parfois, la quantité bu est à peine visible, de cette façon vous saurez précisément la quantité de lait bu.

- ➔ Un tableau pour noter les prises de poids des petits, est disponible gratuitement sur notre site Web **Plan d'alimentation LAKMIL®** prêt à télécharger

L'ALIMENTATION

Vous trouverez des biberons, des aides à l'alimentation NOURRINOU BIBI® et des sondes dans notre boutique www.lakmil.de.

- ◆ Avec les bouteilles standard, assurez-vous qu'elles ne s'étouffent pas.
- ◆ NOURRINOU BIBI® est prêt à l'emploi et peut être installé immédiatement. (Les trous sont déjà présents)
- ◆ Avec notre tétine à 3 niveaux, cela peut être facilement réglé en tournant le biberon.
- ◆ Dans le cas de la petite bouteille souple, vous devez percer vous-même le trou. Nous incluons une aiguille pour l'ouverture progressive.

! Attention: les trous **ne doivent pas être trop gros**, sinon le débit est trop fort et le bébé animal peut s'étouffer dangereusement. Les trous **ne doivent pas être trop petits**, sinon le bébé animal n'en aura pas assez et sera fatigué de téter. N'a donc presque rien bu et s'endort d'épuisement.

Afin de calculer ou d'estimer vos besoins approximatifs, vous pouvez utiliser le tableau ici pour savoir quelle quantité de lait les chiots peuvent consommer **en moyenne.**

- ✗ Les petits doivent etre nourris J**OUR et NUIT**. 5-6 repas ne suffisent donc pas.
- ✗ Les chiots et les chatons ont besoin de nourriture **toutes les heures** pendant les premiers jours.
- ✗ Après cela, il se stabilise toutes les **2 heures.** Jour et nuit!
- ✗ Après le repas = frotter le ventre pour la digestion. Important!
- ✗ Maintenez une température constante dans la caisse de mise bas, pas de courants d'air (qui pourrait également entraîner la diarrhée) 28° serait bien.
- ✗ **La température ambiante** ne doit pas inférieure à 26° (recommandation)
- ✗ **La température ambiante directement** au niveau du chiot serait de 30° recommandée.

IMPORTANT: Les Animaux ne sont pas DES MACHINES. Le besoin de nourriture peut varier.

THE PREPARATION I

- ✔ Preparing **MILK** as **FRESH** as possible. It's not harmful to reheat afterwards, but remember that the milk contains no preservatives or antioxidants!
  If the milk is warmed up again, if possible in a water bath or in a milk bottle warmer. Then stir well so that all ingredients mix well again.
  (Recommendation: in a water bath. Avoid microwave to avoid destroying the ingredients.)
- ✔ Germ-free water. In some areas, the water from the tap is not clean enough for a small baby animal.
  *(Recommendation: buy "still water" for the first 3-4 weeks or boil tap water, germ-free = fully **boiling for at least 3 minutes**)*
- ✔ **Stir water INTO the powder.** Because the powder is otherwise difficult to mix, it tends to float to the top due to its natural ingredients.
- ✔ **LAKMIL® BAGS** are safe on your counter. This means you can easily remove the powder with your measuring spoon. Our packaging can be resealable so that it is light and airtight. Always store in a cool and dry place. *(Store in a dry and cool place, below 25°C.)*

Mixing temperature: 50-55° Stir well with a whisk, shake or mix well in the bottle *(take off the foam afterwards so that the puppy doesn't suck in air and choke).*	**Feeding temperature: max. 38°** *(the mother's body temperature is approx. 38.5°).* → Under no circumstances less than **35°**. This is too cool for the puppy/kitten. They need at least 34° for their digestion.

- ➔ Before feeding your puppy, kitten or other baby animal, **weigh it**. Sometimes the amount drunk is barely visible and so you know how many grams it is heavier after feeding.
- ➔ For your notes, we keep one on our website for all of our products **LAKMIL® Feeding plan** available for download.

THE PREPARATION II

You can find bottles, feeding aids NOURRINOU BIBI® and probes in our shop www.lakmil.de

- ◆ With the standard bottles, make sure you don't choke them.
- ◆ NOURRINOU BIBI® is ready and can be used immediately. (Holes are already present)
- ◆ With our 3-stage teats, this can be easily adjusted by turning the bottle.
- ◆ With the small soft bottle, the hole has to be pierced yourself. We include a needle for gradual opening.

! Attention: the holes must **not be too large**, otherwise the flow will be too strong and the baby animal can dangerously choke. The holes also must **not be too small,** otherwise the baby animal will not get enough and will be tired from sucking. So he hardly drank anything and fell asleep because of exhaustion.

In order to calculate or estimate your **approximate** needs, you can use the table here to see what the **average quantity** of milk the puppies can consume is.

- ✗ You feed **DAY and NIGHT**. 5-6 meals are therefore not enough.
- ✗ Puppies and kittens need food **every hour** for the first few days.
- ✗ After that it settles down to **every 2 hours**. Day and night!
- ✗ After feeding = rub tummy for digestion. Important!
- ✗ Keep the temperature in the whelping box constant, no drafts (can also lead to diarrhea)
  28° would be good.
- ✗ **Room temperature** would not be below 26° (recommendation)
- ✗ The **ambient temperature** directly around the puppy is 30°.

IMPORTANT: Animals are not MACHINES. So the food requirements can vary.

S - Svenska

LA PRÉPARATION

- ✔ Tillred mjölken **precis innan användning** så att den är så **färsk** som möjligt. Det är inte skadligt attvärma upp mjölken i efterhand, men tänk på att den är fri från konserveringsmedel ochantioxidanter. *(Rekommendation: om mjölken ska värmas upp igen, ska detta om möjligt göras i ett vattenbad ellermed en flaskvärmare. Undvik att värma upp mjölken i mikrovågsugn, då detta kan bryta neringredienserna i mjölken.)*
- ✔ **Använd rent vatten, fritt från bakterier.** I vissa områden är inte kranvatten tillräckligt rent för smådjurungar.*(Rekommendation: köp stilla vatten på flaska, eller koka kranvatten före användning under de första3-4 veckorna. Tänk på att vattnet ska koka i minst 3 minuter för att anses som rent.)*
- ✔ **BLANDA NER VATTEN** i pulvret. Pulvret kan i annat fall vara svårt att blanda och tenderar attflyta upp till ytan på grund av sina naturliga ingredienser.
- ✔ LAKMIL® ®-förpackningar går att återförsluta efter användning. Det är säkert att sättaförpackningarna på köksbänken för att enkelt ta ut specifik mängd pulver med hjälp av ett mått.Förpackningarna ska alltid förvaras svalt och torrt. *(Förvara svalt och torrt, vid högst 25°C)*

Temperatur vid tillredning: 50-55°C	**Temperatur vid matning: max. 38°C**
Blanda pulver och vatten med en visp eller skaka flaskan (ta bort skummet efteråt så att valpen/kattungen inte suger in luft.)	(Moderns temperatur är ca. 38,5° C.) → Utfodring får under inga omständigheter ske då mjölkens temperatur är under 35° C. Dessatemperaturer är för låga för valpar/kattungar. De kräver minst 34° C för att stimulera matsmältning.

- ➔ Innan du matar din djurunge **ska den vägas**. Ibland är det svårt att se hur mycket djuret har fått isig, därför kan det vara bra att väga efteråt för att veta exakt hur många gram den har ätit.
- ➔ För att samla dina anteckningar, har vi på vår hemsida LAKMIL® Feeding plan

TILLREDNING

Du kan hitta flaskor, hjälpmedel NOURRINOU BIBI® och sonder i vår shop www.lakmil.de

- Med våra standardflaskor är det viktigt att vara försiktig vidutfodring för att undvika kvävning.
- Med NOURRINOU BIBI® är klar att använda och kan installeras omedelbart. (Hålen finns redan)
- Med våra 3-stegs spenar, kan flödet enkelt justeras genom attvända flaskan.
- Med små mjuka flaskor måste du göra hålet själv. Vi inkluderaren nål för gradvis öppning.

!OBS! hålen **får inte vara för stora**. Om hålen är stora blir flödet för starkt och kan riskera attdjurungen kvävs. Hålen **får inte vara för små.** Om hålen är för små kommer djurungen inte kunna få i sigtillräckligt med mjölk och bli trött av att suga.

För att kunna beräkna **uppskattat näringsbehov** kan du använda dig av tabellen nedan för att se medelvärdet för mängden mjölk valpar konsumerar.

- ✗ Du behöver mata både **DAG och NATT**. 5-6 mål är därför inte tillräckligt.
- ✗ Valpar och kattungar behöver matas **varje timme** under de första dagarna.
- ✗ Efter det, behöver de matas **varannan timme**. Dag och natt!
- ✗ Efteråt är det viktigt att **massera magen** för att stimulera matsmältningen.
- ✗ Se till att **temperaturen i valplådan är konstant** och att det inte finns några svalaluftströmmar. 28° C är optimal temperatur.
- ✗ **Rumstemperaturen** bör inte vara under 26° C. *(Rekommendation)*
- ✗ **Temperaturen som direkt omger valparna** ska vara 30° C.*(Rekommendation)*

KOM IHÅG: Djur är inte maskiner. Så näringsbehovet kan variera. Tabellen nedan ger en överblick av generella näringsbehov.

Alter **Âge** **Age** **Ålder**	**Mahlzeiten** innerhalb 24 Std. **Nombre de repas** dans les 24 h **Number of meals** within 24 h **Antal måltider** inom 24 timmar	 **<10kg**	 **10-25kg**	 **>25kg**
Menge in ml pro Mahlzeit / Quantité en ml par repas / Quantity in ml per meal / Mängd i ml per måltid				
0- Woche 1 ab Woche 1 ab Woche 2 ab Woche 3	ca. 12-16x (oder nach Bedarf) ca. 9-12x (oder nach Bedarf) ca. 6-9x (oder nach Bedarf) ca. 4-6x (oder nach Bedarf)	10-25ml 10-25ml 30-40ml 50-60ml	15-30ml 25-30ml 50-60ml 70-80ml	20-45ml 25-45ml 70-80ml 120-140ml
0 à la semaine 1 à partir semaine 1 à partir semaine 2 à partir semaine 3	environ 12-16x (ou au besoin) environ 9-12x (ou au besoin) environ 6-9x (ou au besoin) environ 4-6x (ou au besoin)	10-25ml 10-25ml 30-40ml 50-60ml	15-30ml 25-30ml 50-60ml 70-80ml	20-45ml 25-45ml 70-80ml 120-140ml
0- week 1 from week 1 from week 2 from week 3	approx. 12-16x (or as needed) approx. 9-12x (or as needed) approx. 6-9x (or as needed) approx. 4-6x (or as needed)	10-25ml 10-25ml 30-40ml 50-60ml	15-30ml 25-30ml 50-60ml 70-80ml	20-45ml 25-45ml 70-80ml 120-140ml
0- vecka 1 från vecka 1 från vecka 2 från vecka 3	ca. 12-16x (eller vid behov) ca. 9-12x (eller vid behov) ca. 6-9x (eller vid behov) ca. 4-6x (eller vid behov)	10-25ml 10-25ml 30-40ml 50-60ml	15-30ml 25-30ml 50-60ml 70-80ml	20-45ml 25-45ml 70-80ml 120-140ml
Beginn **PHASE 2** und erste **Zufütterung** *(langsame Umstellung)* Début de la **PHASE 2** et première **alimentation** complémentaire *(transition lente)* Beginning of **PHASE 2** and first **supplementary feeding** *(slow transition)* Start av **PHASE 2** och första **kompletterande utfodring** *(långsam övergång)*				
ab Woche 4	4-5x + Umstellung auf Welpen-/Kittennahrung	60-70ml	70-80ml	120-140ml
à partir semaine 4	4 à 5x + passage à une alimentation chiots/chatons	60-70ml	70-80ml	120-140ml
from week 4	4-5x + switch to puppy/kitten food	60-70ml	70-80ml	120-140ml
från vecka 4	4-5 gånger + byte till valp-/kattungfoder	60-70ml	70-80ml	120-140ml

COLOSTRUM 24 und COLOSTRUM 24 PRO

Erwachsene Tiere/kranke Tiere/ältere Tiere (zur Stärkung u./o. Genesung) **Animaux adultes/animaux malades/animaux âgés** (pour le renforcement et/ou la convalescence) **Adult animals / sick animals / older animals** (for strengthening and/or recovery) **Vuxna djur/sjuka djur/äldre djur** (för stärkning och/eller återhämtning)		
als **KUR** (14-21 Tage) als **längere Gabe** (>21 Tage)	3x täglich bis zu 2-3 Kapseln 2-3x täglich 1 Kapsel	1-3 Tage, langsam beginnen 1-3 Tage, langsam beginnen
en format **court** (14 à 21 jours) en format **long** (>21 jours)	3 fois par jour, jusqu'à 2 ou 3 gélules 2 à 3 fois par jour, 1 gélule	Commencez lentement pendant 1-3 j. Commencez lentement pendant 1-3 j.
course of treatment (14-21 days) **longer-term** admin. (>21 days)	3 times daily up to 2-3 capsules 2-3 times daily 1 capsule	1-3 days, start slowly 1-3 days, start slowly
som en kort **kurs** (14–21 dagar) som en **längre kurs** (>21 dagar)	3 gånger dagligen upp till 2-3 kapslar 2-3 gånger dagligen, 1 kapsel	Börja långsamt i 1–3 dagar Börja långsamt i 1–3 dagar

Alter **Âge** **Age** **Ålder**	**Mahlzeiten** innerhalb 24 Std. **Nombre de repas** dans les 24 h **Number of meals** within 24 h **Antal måltider** inom 24 timmar	
Menge in ml pro Mahlzeit / Quantité en ml par repas / Quantity in ml per meal / Mängd i ml per måltid		
0- 3 Tage ab Tag 4 ab Woche 2 ab Woche 3 ab Woche 4	ca. 24x (=stündlich) ca. 12x (alle 2 Stunden) ca. 12x (alle 2 Stunden) ca. 8x (alle 3 Stunden **wenn** 10ml Trinkmenge pro Mahlzeit erreicht sind und das Gewicht des Kitten i.o. ist.) ca. 8x (alle 3 Stunden) ca. 6x (alle 4 Stunden)	1-2ml 2-4ml 5-10ml 10-15ml 10-20ml ca. 20ml
0 à 3 jours À partir du 4e jour À partir 2e semaine À partir 3e semaine À partir 4e semaine	a. 24 fois par heure Environ 12 fois (toutes les 2 heures) Environ 12 fois (toutes les 2 heures) Environ 8 fois (toutes les 3 heures **si** le chaton boit 10 ml par biberon et que son poids est normal) Environ 8 fois toutes les 3 heures Environ 6 fois toutes les 4 heures	1-2ml 2-4ml 5-10ml 10-15ml 10-20ml environ 20ml
0-3 days from day 4 from week 2 from week 3 from week 4	a. 24x (hourly) approx. 12x (every 2 hours) approx. 12x (every 2 hours) approx. 8x (every 3 hours once 10ml of liquid per feeding is reached and the kitten's weight is normal.) approx. 8x (every 3 hours) approx. 6x (every 4 hours)	1-2ml 2-4ml 5-10ml 10-15ml 10-20ml approx. 20ml
0–3 dagar från dag 4 från vecka 2 från vecka 3 från vecka 4	a. 24x (var timme) ca 12x (varannan timme) ca 12x (varannan timme) ca 8x (var tredje timme **om** 10 ml vatten dricker per matning och kattungens vikt ligger inom normalintervallet) ca 8x (var tredje timme) ca 6x (var fjärde timme)	1-2ml 2-4ml 5-10ml 10-15ml 10-20ml ca 20ml
Beginn Zufütterung:**PHASE 1**+Nassfutter/PHASE 2 [suppig,soßenartig] *(langsame Umstellung)* Début de l'alimentation complém.:**PHASE 1**+aliments humides/PHASE 2 [soupe,sauce] *(transition progressive)* Start of supplementary feeding:**PHASE 1**+wet food/PHASE 2 [soupy, sauce-like] *(gradual transition)* Början av kompletterande utfodring:**PHASE 1**+våtfoder/PHASE 2 [soppliknande,såsliknande] *(gradvis övergång)*		
4-6 Wochen	bei Umstellung auf Napffütterung: 3x tagsüber **PHASE 1** in Flasche + Napffütterung *(Solange Kitten Interesse an Flasche zeigt)*	ca. 20ml
4 à 6 semaines	Lors du passage à l'alimentation en gamelle: **PHASE 1:** 3 repas par jour au biberon + alimentation en gamelle *(Tant que le chaton s'intéresse au biberon)*	environ 20 ml
4-6 weeks	When switching to bowl feeding: 3 times a day **PHASE 1** in a bottle + bowl feeding *(As long as the kitten shows interest in the bottle)*	approx. 20ml
4–6 veckor	Vid byte till skålmatning: 3 gånger under dagen **PHASE 1** i flaska + skålmatning *(Så länge kattungen visar intresse för flaskan)*	ca 20 ml

Es handelt sich um Durchschnittsmengen. Je nach Tier kann es mehr oder weniger sein.
Ce sont des quantités moyennes. Selon l'animal, elles peuvent être supérieures ou inférieures.
These are average amounts. It may be more or less depending on the animal.
Dessa är genomsnittliga mängder. Beroende på djuret kan det vara mer eller mindre.

COLOSTRUM 24

0-24 (max. 48) Stunden nach Geburt
0 à 24 heures (maximum 48 heures) après la naissance
0-24 (maximum 48) hours after birth
0–24 (max. 48) timmar efter födseln

Kapsel/n		Wasser
Capsule(s)		Eau
Capsule(s)		Water
Kapsel(ar)		Vatten
1	460mg (0,46g)	2,76ml
2	920mg (0,92g)	5,52ml
3	1380mg (1,38g)	8,28ml
4	1840mg (1,84g)	11,04ml
5	2300mg (2,30g)	13,80ml
6	2760mg (2,76g)	16,56ml
7	3220mg (3,22g)	19,32ml
8	3680mg (3,68g)	22,08ml
9	4140mg (4,14g)	24,84ml
10	4600mg (4,60g)	27,60ml
11	5060mg (5,06g)	30,36ml

Pulver	Kleiner Messlöffel	Wasser
Poudre	Petite cuillère doseuse	Eau
Powder	Small measuring spoons	Water
Pulver	Liten mätsked	Vatten
1	5g	30ml
2	10g	60ml
3	15g	90ml
4	20g	120ml
5	25g	150ml

Bei erster Fütterung etwas dünnflüssiger anrühren.
je 5g Pulver + 5ml Wasser hinzufügen
Lors de **la première utilisation** de lait, diluez-le davantage.
Ajouter 5g de poudre + 5 ml d'eau.
For the **first use**, mix the milk with more liquid to make it thinner.
Add 5g of powder to 5ml of water.
Blanda mjölken tunnare **första gången** du använder den.
Tillsätt 5g pulver + 5 ml vatten.

PHASE 1

ab Geburt oder nach der Gabe von **Colostrum 24**
dès la naissance ou après l'administration du **Colostrum 24**
from birth or after the administration of **Colostrum 24**
från födseln eller efter administrering av **Colostrum 24**

Kleiner	Großer	Messlöffel	Wasser
Petite	Grande	Cuillère Doseuse	Eau
Small	Large	Measuring Spoon	Water
Liten	Stor	Mätsked	Vatten
1	-	5g	20ml
5	1	25g	100ml
10	2	50g	200ml
20	4	100g	400ml
50	10	250g	1000ml
	12	300g	1200ml
	16	400g	1600ml

100% ZIEGENVOLLMILCH

OHNE LAKMIL® Vitamine, Mineralstoffe u. Spurenelemente.
SANS vitamines, minéraux et oligo-éléments LAKMIL®.
WITHOUT LAKMIL® Vitamins, minerals and trace elements.
UTAN LAKMIL® vitaminer, mineraler och spårämnen.

Kleiner	Großer	Messlöffel	Wasser
Petite	Grande	Cuillère Doseuse	Eau
Small	Large	Measuring Spoon	Water
Liten	Stor	Mätsked	Vatten
1	-	5g	20ml
5	1	25g	100ml
10	2	50g	200ml
20	4	100g	400ml
50	10	250g	1000ml
	12	300g	1200ml
	16	400g	1600ml
	12	300g	1200ml
	16	400g	1600ml

PHASE 2

Umstellung/Beifütterung/nach **PHASE 1**
Transition/Alimentation complém./après la **PHASE 1**
Transition/Supplementary feeding/after **PHASE 1**
Övergångs-/tillskottsutfodring/efter **PHASE 1**

Kleiner	Großer	Messlöffel	Wasser
Petite	Grande	Cuillère Doseuse	Eau
Small	Large	Measuring Spoon	Water
Liten	Stor	Mätsked	Vatten
5	1	25g	50ml
10	2	50g	100ml
15	3	75g	150ml
20	4	100g	200ml
25	5	125g	250ml
30	6	150g	300ml
35	7	175g	350ml
40	8	200g	400ml
50	10	250g	450ml

Kleiner Messlöffel
Petite cuillère doseuse
Small measuring spoons
Liten mätsked

5g/10ml

Großer Messlöffel
Grande cuillère doseuse
Large measuring spoons
Stor mätsked

25g/50ml